

Blutuntersuchung zur Leberfunktion

Bei einigen Patienten, die BOSENTAN BASICS eingenommen haben, wurden veränderte Leberfunktionswerte und niedrige Hämoglobinwerte (Anämie) festgestellt. Während der Behandlung mit BOSENTAN BASICS wird Ihr Arzt Termine für regelmäßige Blutuntersuchungen ansetzen. Dabei wird überprüft, ob Veränderungen Ihrer Leberfunktion oder Hämoglobinwerte aufgetreten sind.

Denken Sie an die monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion.

Nach einer Dosiserhöhung wird ein zusätzlicher Test nach 2 Wochen durchgeführt.

Denken Sie an die monatliche Untersuchung zur Anämie während der ersten 4 Monate der Behandlung und anschließend alle 3 Monate.

Datum des ersten monatlichen Tests: _____

Termine für Ihre monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Jan _____ | <input type="checkbox"/> Apr _____ | <input type="checkbox"/> Juli _____ | <input type="checkbox"/> Okt _____ |
| <input type="checkbox"/> Feb _____ | <input type="checkbox"/> Mai _____ | <input type="checkbox"/> Aug _____ | <input type="checkbox"/> Nov _____ |
| <input type="checkbox"/> März _____ | <input type="checkbox"/> Juni _____ | <input type="checkbox"/> Sep _____ | <input type="checkbox"/> Dez _____ |

5179898

PATIENTENKARTE

Wichtige Warnhinweise zur Anwendungssicherheit für Patienten, die BOSENTAN BASICS (Bosentan) einnehmen

Diese Karte enthält wichtige Informationen zu BOSENTAN BASICS. Bitte lesen Sie die Karte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme von BOSENTAN BASICS beginnen.

Ihr Name: _____

Behandelnder Arzt: _____

Wenn Sie Fragen zu BOSENTAN BASICS haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

Basics GmbH



Wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter sind, lesen Sie diese Karte bitte sehr sorgfältig.

Schwangerschaft

BOSENTAN BASICS kann schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Feten haben. Daher dürfen Sie BOSENTAN BASICS nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind. Sie dürfen während der Behandlung mit BOSENTAN BASICS auch nicht schwanger werden.

Darüber hinaus kann es, wenn Sie an pulmonaler Hypertonie leiden, bei einer Schwangerschaft zu einer schwerwiegenden Verschlechterung Ihrer Krankheitssymptome kommen. Falls Sie vermuten, dass Sie schwanger sind, informieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt oder Gynäkologen.

Empfängnisverhütung

Eine Verhütung basierend auf Hormonen – wie orale Verhütungsmittel und Antibabypillen, Hormonspritzen, Implantate oder Verhütungspflaster, ist keine zuverlässige Methode, um eine Schwangerschaft bei mit BOSENTAN BASICS behandelten Frauen zu verhindern. Sie müssen Barriere-Methoden – wie ein Kondom für die Frau, Diaphragma oder einen Verhütungs-Schwamm – zusätzlich zu irgendeinem dieser hormonalen Verhütungsmittel anwenden. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle Ihre Fragen mit Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen besprechen – füllen Sie bitte die Karte aus und bringen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit.

Bei Ihnen sollte ein Schwangerschaftstest vor Beginn der BOSENTAN BASICS-Therapie und monatlich während der Behandlung durchgeführt werden, auch wenn Sie glauben, dass Sie nicht schwanger sind.

Datum des ersten monatlichen Schwangerschaftstests: _____

Empfängnisverhütung

Wenden Sie zur Zeit Verhütungsmittel an?

ja nein

Falls ja, notieren Sie bitte hier die Bezeichnungen:

Nehmen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit, sie/er wird Sie informieren, ob Sie zusätzliche oder andere Verhütungsmethoden benötigen.